

GRUPOS MAGNÉTICOS FINITOS Y SUS REPRESENTACIONES

JOSÉ CANTARERO Y HIGINIO SERRANO GARCIA

RESUMEN. En este artículo damos una introducción elemental a la teoría de representaciones de grupos magnéticos finitos desde un punto de vista puramente matemático.

1. INTRODUCCIÓN

Una de las áreas más grandes e importantes dentro del campo de la física es la llamada *materia condensada y física del estado sólido*, que a grandes rasgos estudia sistemas mecánico-cuánticos con una gran cantidad de partículas que interactúan entre sí. La alta complejidad de los sistemas que esta disciplina estudia se puede reducir gradualmente al usar una poderosa herramienta: la *simetría*. Dentro del catálogo de las simetrías, que aparecen en el contexto de la materia condensada, están los *grupos cristalográficos magnéticos*; grupos que contienen traslaciones, rotaciones, reflexiones e inversiones temporales. Estos grupos han sido ampliamente estudiados y clasificados en su totalidad desde finales del siglo XIX. Evgraf Fedorov [2] realizó la primera clasificación de grupos cristalográficos que no contienen inversión temporal. Posteriormente, Shubnikov y Belov [16] incorporaron las inversiones temporales. Para una descripción más actual se puede consultar [1] o [14].

Estudiar los grupos cristalográficos magnéticos y sus representaciones ha sido parte fundamental en la predicción de nuevas fases topológicas de la materia tales como aislantes topológicos [11], materiales altermagnéticos [8], aislantes de Chern [13], etc. La principal diferencia con los grupos usuales y sus representaciones es que las representaciones de grupos magnéticos incorporan operadores tanto lineales como antilineales. Por ello es recomendable, más no indispensable, que el lector haya tenido un contacto con la teoría de representaciones de grupos finitos [4] pues así notará las similitudes y diferencias de las teorías.

La intención de este artículo es dar una introducción moderna a la teoría de representaciones de grupos magnéticos finitos, iniciada por E. Wigner [17], poniendo especial énfasis en resultados claves como el lema de Schur (lema 5.6) y la clasificación de representaciones irreducibles (teorema 6.1). El enfoque es completamente matemático, y las conexiones e interpretaciones físicas mencionadas en el texto no son necesarias para comprender el contenido. Con el objetivo de hacer este tema

2020 Mathematics Subject Classification. 20C35, 81R05.

Palabras clave. Grupos magnéticos, teoría de representaciones, correpresentaciones.

más accesible, el escrito se formula principalmente en términos de álgebra lineal y teoría de grupos, con breves menciones a conceptos categóricos que, si bien no son esenciales, pueden resultar útiles para el lector familiarizado con ellos.

Notación: Denotaremos a la clase del entero k en \mathbb{Z}/n simplemente como k . También usaremos id_X para denotar la función identidad $X \rightarrow X$ o solamente id cuando X se pueda deducir del contexto.

Agradecimientos: HS agradece el apoyo de la Simons Foundation, apoyo SFI-MPS-T-Institutes-00007697, y al Ministerio de Educación y Ciencia de la República de Bulgaria, apoyo DO1-239/10.12.2024. La elaboración de este artículo fue apoyada por CONAHCYT (ahora Secihti) en el año 2023 mediante el proyecto de Ciencia de Frontera CF-2023-I-2649.

2. GRUPOS MAGNÉTICOS

Consideremos la extensión de campos

$$\begin{array}{c} \mathbb{C} \\ \downarrow \\ \mathbb{R} \end{array}$$

y denotemos al grupo de automorfismos de dicha extensión por

$$\text{Aut}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) = \left\{ f: \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C} \mid \begin{array}{l} f \text{ es un isomorfismo de campos,} \\ f(x) = x \text{ para todo } x \in \mathbb{R} \end{array} \right\}.$$

Este grupo resulta ser isomorfo a $\mathbb{Z}/2$ como veremos a continuación.

Proposición 2.1. *El grupo de automorfismos de la extensión de campos \mathbb{C}/\mathbb{R} consta de dos elementos, concretamente*

$$\text{Aut}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) = \{\text{id}, \mathbb{K}\},$$

donde \mathbb{K} es el automorfismo definido por la conjugación compleja. En particular, $\text{Aut}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$ es isomorfo a $\mathbb{Z}/2$.

Demostración: Dado $f \in \text{Aut}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$ y $z = x + iy$, se tiene

$$\begin{aligned} f(z) &= f(x + iy) \\ &= f(x) + f(iy) \\ &= x + f(i)y. \end{aligned}$$

Vemos que f queda totalmente determinado por su valor en i . Este valor lo podemos calcular de la igualdad

$$f(i)^2 = f(i^2) = f(-1) = -1,$$

de donde se sigue que $f(i) = \pm i$. Si $f(i) = i$, entonces f es la identidad y si $f(i) = -i$, entonces $f = \mathbb{K}$. Por último, notemos que conjugar dos veces produce la identidad, es decir, $\mathbb{K}^2 = \text{id}$. \square

El grupo de automorfismos de la extensión \mathbb{C}/\mathbb{R} nos ayudará a codificar la forma en la que las simetrías magnéticas actuarán en los espacios vectoriales. Algunos elementos del grupo serán operadores lineales mientras que otros serán antilineales.

Definición 2.2. Un **grupo magnético** es una pareja (G, ϕ) donde G es un grupo y $\phi: G \rightarrow \mathbb{Z}/2$ es un epimorfismo de grupos.

Al núcleo del homomorfismo ϕ lo denotaremos por G_0 . Esta información la resumiremos con la siguiente sucesión exacta:

$$1 \longrightarrow G_0 \longrightarrow G \xrightarrow{\phi} \mathbb{Z}/2 \longrightarrow 1,$$

la cual también se conoce como una extensión de grupos. En general, cualquier epimorfismo $f: G \rightarrow Q$ de grupos define una extensión de grupos

$$1 \longrightarrow \text{Ker}(f) \longrightarrow G \xrightarrow{f} Q \longrightarrow 1.$$

donde el morfismo $\text{Ker}(f) \rightarrow G$ es la inclusión. También es posible construir una extensión de grupos a partir de dos grupos N, Q , y un homomorfismo $h: Q \rightarrow \text{Aut}(N)$. El producto semidirecto $N \rtimes_h Q$ es el producto cartesiano $N \times Q$ equipado con el producto

$$(n, q)(m, p) = (n \cdot h(q)(m), q \cdot p),$$

que lo convierte en un grupo. Es común referirse a $h(q)(m)$ como la acción de q sobre m pues define una acción de Q sobre N . Existe un epimorfismo $\pi: N \rtimes_h Q \rightarrow Q$ que envía (n, q) a q , cuyo núcleo es isomorfo a N , por lo que da lugar a una sucesión exacta

$$1 \longrightarrow N \longrightarrow N \rtimes_h Q \xrightarrow{\pi} Q \longrightarrow 1.$$

Cuando h es claro a partir del contexto, se denota simplemente por $N \rtimes Q$.

Ejemplo 2.3. Un ejemplo de estos grupos surge naturalmente de considerar las simetrías cristalográficas. Intuitivamente, un cristal es un sólido cuyos átomos están dispuestos en varias retículas tridimensionales. Un cristal con espín es un cristal ordinario en el que cada átomo lleva un pequeño “imán” interno, llamado espín, que no está determinado únicamente por su posición y cuya organización colectiva da lugar a propiedades magnéticas y otras propiedades físicas del material. Las simetrías de los cristales con espín viven dentro del producto cartesiano de $\mathbb{Z}/2$ con el grupo de transformaciones afines¹ de \mathbb{R}^3 :

$$\text{Aff}(\mathbb{R}^3) \times \mathbb{Z}/2 \cong (\mathbb{R}^3 \rtimes O(3)) \times \mathbb{Z}/2,$$

¹Una transformación afín de \mathbb{R}^3 es una función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que preserva la distancia euclíadiana.

donde el grupo \mathbb{R}^3 contiene las simetrías de traslación del cristal, el grupo $O(3)$ contiene las simetrías ortogonales, es decir, rotaciones compuestas con inversiones espaciales, y el grupo $\mathbb{Z}/2$ contiene a la simetría de inversión temporal. Para ser más preciso, las simetrías de un cristal espín están codificadas por una subextensión como se muestra a continuación:


$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \Lambda & \longrightarrow & G & \longrightarrow & P \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 1 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & (\mathbb{R}^3 \rtimes O(3)) \times \mathbb{Z}/2 & \longrightarrow & O(3) \times \mathbb{Z}/2 \longrightarrow 1, \end{array}$$

donde Λ es isomorfo a \mathbb{Z}^3 y P es un grupo finito. De manera más explícita, es un subgrupo G de $\text{Aff}(\mathbb{R}^3) \times \mathbb{Z}/2$ tal que su intersección Λ con el subgrupo \mathbb{R}^3 de traslaciones es isomorfo a \mathbb{Z}^3 , y tal que G/Λ es finito. Al grupo Λ se le conoce como **retícula de Bravais**, al grupo G como el **grupo cristalográfico magnético** y a P como el **grupo puntual magnético**.

Notemos que tanto G como P están equipados con un homomorfismo a $\mathbb{Z}/2$. En el caso de P , está dado por la inclusión a $O(3) \times \mathbb{Z}/2$ seguido de la proyección al segundo factor, y para G , componemos el epimorfismo $G \rightarrow P$ con este homomorfismo $P \rightarrow \mathbb{Z}/2$ de manera que obtenemos un diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & P \\ & \searrow \phi_G & \downarrow \phi_P \\ & & \mathbb{Z}/2. \end{array}$$

FIGURA 1. Vista superior del compuesto U_2Pd_2In , extraída de [5]. Las esferas con flechas representan átomos de Urano, las grises son átomos de Paladio y las rosas son átomos de Indio.



En la figura 1 se puede apreciar al compuesto U_2Pd_2In . Esta molécula tiene como grupo puntual magnético $(\mathbb{Z}/4, \text{mod } 2)$ donde el generador de $\mathbb{Z}/4$ es una rotación

de noventa grados en el plano $a - b$ seguida del operador de inversión temporal. Las flechas rojas denotan la dirección del espín. Notemos que la inversión temporal solo afecta la dirección del espín. El lector que quiera conocer un poco más acerca de la física detrás de estos grupos puede consultar [18] y todas las referencias que ahí se encuentran, así como [1], que contiene la clasificación completa.

Ejemplo 2.4. Sea V un espacio vectorial sobre \mathbb{C} de dimensión finita. El **grupo magnético general lineal de V** es

$$\mathbf{GL}(V) = \left\{ A: V \rightarrow V \mid \begin{array}{l} A \text{ es un operador invertible} \\ \text{lineal o antilineal} \end{array} \right\}.$$

Un operador $A: V \rightarrow V$ entre espacios vectoriales complejos es lineal si $A(zv + w) = zA(v) + A(w)$ y antilineal si $A(zv + w) = \bar{z}A(v) + A(w)$ para $v, w \in V$ y $z \in \mathbb{C}$. Es claro que $\mathbf{GL}(V)$ es un grupo y además viene provisto de manera natural con el homomorfismo

$$\begin{aligned} \phi: \mathbf{GL}(V) &\longrightarrow \mathbb{Z}/2, \\ A &\longmapsto \begin{cases} 1, & \text{si } A \text{ es antilineal,} \\ 0, & \text{si } A \text{ es lineal.} \end{cases} \end{aligned}$$

El núcleo de este homomorfismo es el grupo $\mathrm{GL}(V)$ de operadores lineales invertibles de V . Si $V = \mathbb{C}^n$,

¿podemos describir al grupo $\mathbf{GL}(V)$ en términos de matrices?

Para responder a la pregunta, primero notemos que tenemos dos funciones

$$(1) \quad \begin{aligned} \Psi: \mathbf{GL}(\mathbb{C}^n) &\longrightarrow \mathrm{GL}(n) \times \mathbb{Z}/2, \\ A &\longmapsto (A \circ \mathbb{K}^{\phi(A)}, \phi(A)), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Phi: \mathrm{GL}(n) \times \mathbb{Z}/2 &\longrightarrow \mathbf{GL}(\mathbb{C}^n), \\ (A, \varepsilon) &\longmapsto A \circ \mathbb{K}^\varepsilon, \end{aligned}$$

donde $\mathbb{K}^0 = \mathrm{id}: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ y $\mathbb{K}^1 = \mathbb{K}: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ denota el operador de conjugación compleja entrada a entrada. Invitamos al lector a comprobar que Φ es la inversa de Ψ . Sin embargo, Ψ y Φ no son homomorfismos puesto que

$$\begin{aligned} \Psi(AB) &= (AB \circ \mathbb{K}^{\phi(AB)}, \phi(AB)) \\ &= (AB \circ \mathbb{K}^{\phi(A)} \mathbb{K}^{\phi(B)}, \phi(A)\phi(B)) \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}
 \Psi(A)\Psi(B) &= (A \circ \mathbb{K}^{\phi(A)}, \phi(A))(B \circ \mathbb{K}^{\phi(B)}, \phi(B)) \\
 &= (A \circ \mathbb{K}^{\phi(A)} \circ B \circ \mathbb{K}^{\phi(B)}, \phi(A)\phi(B)) \\
 (2) \quad &= (A\mathbb{K}^{\phi(A)}(B) \circ \mathbb{K}^{\phi(A)}\mathbb{K}^{\phi(B)}, \phi(A)\phi(B))
 \end{aligned}$$

no son iguales. No obstante, la ecuación 2 nos dice que si consideramos el producto semidirecto $\mathrm{GL}(n) \rtimes \mathbb{Z}/2$ donde la acción de $\mathbb{Z}/2$ sobre $\mathrm{GL}(n)$ conjuga complejamente todas las entradas de la matriz, entonces Ψ define un isomorfismo

$$\mathrm{GL}(\mathbb{C}^n) \xrightarrow{\cong} \mathrm{GL}(n) \rtimes \mathbb{Z}/2.$$

Definición 2.5. Un **morfismo** entre dos grupos magnéticos (G, ϕ_G) y (H, ϕ_H) es un homomorfismo de grupos $f: G \longrightarrow H$ tal que el siguiente diagrama conmuta

$$\begin{array}{ccc}
 G & \xrightarrow{f} & H \\
 \searrow \phi_G & & \swarrow \phi_H \\
 & \mathbb{Z}/2. &
 \end{array}$$

Denotemos por **Grp** la **categoría de grupos magnéticos** y por **Grp** la **categoría de grupos**.

3. REPRESENTACIONES

Ahora estamos listos para definir las representaciones de los grupos magnéticos. Los resultados que mostramos en esta sección se basan en los trabajos de E. Wigner (sección 26 de [17]), en donde se enfatiza la importancia así como el uso de los grupos y sus representaciones en el estudio de la mecánica cuántica. Es deseable, aunque no necesario, que el lector ya haya tenido contacto con la teoría de representaciones de grupos finitos. Recomendamos revisar los primeros tres capítulos del clásico libro [4], así se podrán apreciar las similitudes y diferencias con respecto a lo que aquí mostraremos. De ahora en adelante el grupo G será finito, a menos que se diga lo contrario.

En general, la teoría de representaciones busca representar objetos matemáticos abstractos mediante transformaciones de estructuras matemáticas más concretas, con el propósito de reducir la abstracción o facilitar cálculos. Por ejemplo, una representación de un grupo G en un espacio vectorial complejo V asigna a cada elemento del grupo un isomorfismo lineal de V mediante un homomorfismo $G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$.

Definición 3.1. Una **representación** de un grupo magnético (G, α) en un espacio vectorial complejo V de dimensión finita es un homomorfismo de grupos magnéticos

$$\rho: (G, \alpha) \longrightarrow (\mathrm{GL}(V), \phi).$$

Este homomorfismo determina una acción de G sobre V dada por $g \cdot v = \rho(g)(v)$. La compatibilidad del homomorfismo ρ con los homomorfismos a $\mathbb{Z}/2$ significa que los elementos de G en el núcleo de ϕ actúan sobre V de forma lineal mientras los que no están en el núcleo lo harán de forma antilineal. Si $V = \mathbb{C}^n$, entonces por el isomorfismo dado en la ecuación 1 podemos escribir cualquier representación como un homomorfismo

$$\begin{aligned}\rho: G &\longrightarrow \mathrm{GL}(n) \rtimes \mathbb{Z}/2, \\ g &\longmapsto (\rho'(g), \phi(g)),\end{aligned}$$

para cierta función $\rho': G \longrightarrow \mathrm{GL}(n)$. Usando que ρ es un homomorfismo y la forma de la multiplicación en el producto semidirecto, vemos que es ρ' no es un homomorfismo pero satisface la condición similar

$$(3) \quad \rho'(gh) = \rho'(g) \circ \mathbb{K}^{\phi(g)}(\rho'(h)).$$

Ejemplo 3.2. Consideremos el grupo magnético $(\mathbb{Z}/4, \text{mod } 2)$. Dos de sus representaciones están dadas por

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}/4 &\longrightarrow \mathbf{GL}(\mathbb{C}), \\ 1 &\longmapsto \mathbb{K},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}/4 &\longrightarrow \mathbf{GL}(\mathbb{C}^2), \\ 1 &\longmapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \circ \mathbb{K}.\end{aligned}$$

En general, cualquier representación de este grupo es de la forma

$$1 \longmapsto A \circ \mathbb{K}$$

con $A \in \mathrm{GL}(n)$, y además satisface que

$$\begin{aligned}\mathrm{id} &= (A \mathbb{K})^4 \\ &= A \circ \mathbb{K} \circ A \circ \mathbb{K} \circ A \circ \mathbb{K} \circ A \circ \mathbb{K} \\ &= A \bar{A} \circ \mathbb{K}^2 \circ A \bar{A} \circ \mathbb{K}^2 \\ &= (A \bar{A})^2.\end{aligned}$$

El mismo argumento muestra que cualquier representación del grupo magnético $(\mathbb{Z}/2n, \text{mod } 2)$, está dada por

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}/2n &\longrightarrow \mathbf{GL}(\mathbb{C}^m), \\ 1 &\longmapsto A \circ \mathbb{K},\end{aligned}$$

donde $A \in \mathrm{GL}(m)$ y $(A \bar{A})^n = \mathrm{id}$.

Ejemplo 3.3. Para cualquier grupo magnético finito (G, ϕ) , su representación regular $\mathbb{C}[G, \phi]$ es el espacio vectorial complejo $\mathbb{C}[G]$ cuya base es G , con la acción de (G, ϕ) dada por

$$g \cdot \sum_i \lambda_i g_i = \sum_i \mathbb{K}^{\phi(g)}(\lambda_i)(gg_i).$$

Definición 3.4. Un **morfismo** entre dos representaciones $\rho_i: G \rightarrow \mathbf{GL}(V_i)$ $i = 1, 2$ es una transformación lineal $T: V_1 \rightarrow V_2$ tal que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} V_1 & \xrightarrow{\rho_1(g)} & V_1 \\ T \downarrow & & \downarrow T \\ V_2 & \xrightarrow{\rho_2(g)} & V_2 \end{array}$$

commuta para todo $g \in G$.

Denotemos la categoría de representaciones del grupo magnético (G, ϕ) por $\mathbf{Rep}(G, \phi)$ y por $\mathbf{Rep}(G_0)$ a la categoría de representaciones (clásicas) del grupo G_0 . Al conjunto de morfismos entre dos representaciones ρ_1 y ρ_2 de (G, ϕ) ó G_0 lo denotaremos por $\mathrm{Hom}_{(G, \phi)}(\rho_1, \rho_2)$ ó $\mathrm{Hom}_{G_0}(\rho_1, \rho_2)$, respectivamente.

4. REPRESENTACIONES INDUCIDAS

Notemos que al restringir una representación de (G, ϕ) al subgrupo G_0 obtenemos una representación de G_0 . De hecho, restricción define un functor

$$\mathrm{Res}_{G_0}^G: \mathbf{Rep}(G, \phi) \rightarrow \mathbf{Rep}(G_0).$$

Si ahora comenzamos con una representación del grupo G_0 , entonces

¿cómo podemos asociarle una representación de (G, ϕ) ?

Definición 4.1. Sea $\rho: G_0 \rightarrow \mathbf{GL}(V)$ una representación del grupo G_0 . La **representación inducida** de V a (G, ϕ) está dada por el espacio vectorial

$$\mathrm{Ind}_{G_0}^G V = \mathbb{C}[G, \phi] \otimes_{\mathbb{C}[G_0]} V,$$

donde $\mathbb{C}[G, \phi]$ es la representación regular del grupo magnético (G, ϕ) y $\mathbb{C}[G_0]$ es la representación regular del grupo G_0 . La acción del grupo magnético (G, ϕ) en $\mathrm{Ind}_{G_0}^G V$ está dada por la acción en el primer factor.

La construcción anterior se puede extender a los morfismos de representaciones para producir un functor

$$\mathrm{Ind}_{G_0}^G: \mathbf{Rep}(G_0) \rightarrow \mathbf{Rep}(G, \phi).$$

Los funtores $\mathrm{Res}_{G_0}^G$ y $\mathrm{Ind}_{G_0}^G$ son muy importantes, pues, entre otras cosas, nos permitirán construir representaciones irreducibles de (G, ϕ) a partir de representaciones

irreducibles de G_0 . Pero antes daremos otra forma más elemental de pensar la inducción.

Sea $\rho: G_0 \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ una representación de G_0 y fijemos un elemento $a \in G \setminus G_0$. Consideremos el espacio vectorial

$$aV = \{av \mid v \in V\}$$

con las operaciones

$$av + aw = a(v + w), \quad \lambda \cdot av = a(\bar{\lambda}v).$$

Definimos la **representación conjugada** de ρ como

$$(4) \quad \begin{aligned} \rho^*: G_0 &\longrightarrow \mathrm{GL}(aV), \\ g &\longmapsto \overline{\rho(a^{-1}ga)}, \end{aligned}$$

donde

$$\overline{\rho(a^{-1}ga)}(av) = a[\rho(a^{-1}ga)(v)].$$

Veamos que ρ^* es un homomorfismo de grupos

$$\begin{aligned} \rho^*(gh)(av) &= a[\rho(a^{-1}gha)(v)] \\ &= a[\rho(a^{-1}gaa^{-1}ha)(v)] \\ &= a[\rho(a^{-1}ga)\rho(a^{-1}ha)(v)] \\ &= \rho^*(g)(a[\rho(a^{-1}ha)(v)]) \\ &= [\rho^*(g) \circ \rho^*(h)](av). \end{aligned}$$

Por lo tanto ρ^* es una representación de G_0 . Es conveniente explicar la notación en detalle, para lo cual introducimos los conjugados de operadores lineales.

Definición 4.2. Dado un operador lineal $S: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$, su conjugado es el operador lineal $\overline{S} = \mathbb{K}S\mathbb{K}$.

Cuando $V = \mathbb{C}^n$, el isomorfismo lineal $a\mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ dado por $av \mapsto \bar{v}$ se convierte en un isomorfismo de representaciones si a \mathbb{C}^n le damos la acción

$$gw = \overline{\rho(a^{-1}ga)(\bar{w})} = \mathbb{K}\rho(a^{-1}ga)\mathbb{K}(w).$$

Si identificamos $a\mathbb{C}^n$ con \mathbb{C}^n mediante este isomorfismo, obtenemos

$$(5) \quad \rho^*(g) = \mathbb{K}\rho(a^{-1}ga)\mathbb{K} = \overline{\rho(a^{-1}ga)}.$$

De aquí viene la notación usada en la definición original de ρ^* . Si estamos trabajando con un espacio vectorial V sin una elección de base, hay que ser más cuidadoso al definir el conjugado de un operador lineal $T: aV \rightarrow V$. Puesto que $a: \mathbb{C}^n \rightarrow a\mathbb{C}^n$ se transforma en \mathbb{K} bajo el isomorfismo $a\mathbb{C}^n \cong \mathbb{C}^n$, en este contexto definimos el conjugado de T como sigue.

Definición 4.3. Dado un operador lineal $T: aV \rightarrow V$, su conjugado es el operador lineal

$$\begin{aligned}\overline{T}: V &\longrightarrow aV, \\ v &\longmapsto aT(av).\end{aligned}$$

Observación 4.4. Notemos que tenemos una partición

$$G = G_0 \sqcup aG_0$$

del grupo G . Es fácil probar que definir un homomorfismo $f: G \rightarrow H$ es equivalente a proporcionar un homomorfismo $f_0: G_0 \rightarrow H$ y un elemento $h \in H$ que satisfacen

- (1) $f_0(a^{-1}ga) = h^{-1}f_0(g)h$ para todo $g \in G_0$, y
- (2) $f_0(a^2) = h^2$.

El homomorfismo f coincidiría con f_0 en G_0 y estaría dado por $f(ag) = hf_0(g)$ en aG_0 . Si H es un grupo magnético y $h \notin H_0$, entonces f define un morfismo de grupos magnéticos. Por esta razón, de ahora en adelante solo damos los valores de las representaciones de un grupo magnético (G, ϕ) en G_0 y en a , y dejamos como ejercicio para el lector comprobar que estas tres condiciones se satisfacen en cada caso.

Volviendo a la situación anterior, el homomorfismo $\rho: G_0 \rightarrow \mathbf{GL}(V)$ da lugar a la representación

$$\begin{aligned}\tilde{\rho}: G &\longrightarrow \mathbf{GL}(V \oplus aV), \\ g &\longmapsto \begin{cases} \begin{pmatrix} \rho(g) & 0 \\ 0 & \rho(g)^* \end{pmatrix}, & \text{si } g \in G_0, \\ \begin{pmatrix} 0 & \rho(a^2)a^{-1} \\ a & 0 \end{pmatrix}, & \text{si } g = a, \end{cases}\end{aligned}$$

de (G, ϕ) , donde $a: V \rightarrow aV$ y $a^{-1}: aV \rightarrow V$ son los operadores antilineales que uno se imagina. Cuando $V = \mathbb{C}^n$, entonces podemos identificar aV igualmente con \mathbb{C}^n y el operador $a: V \rightarrow aV$ con el operador $\mathbb{K}: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ de conjugación compleja entrada a entrada. Con estas identificaciones, se tiene

$$(6) \quad \tilde{\rho}(a) = \begin{pmatrix} 0 & \rho(a^2) \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \circ \mathbb{K}.$$

Proposición 4.5. Sea $a \in G \setminus G_0$ y V una representación de G_0 . Entonces existe un isomorfismo de representaciones

$$\mathrm{Ind}_{G_0}^G V \longrightarrow V \oplus aV.$$

Demostración: Cualquier elemento de $\text{Ind}_{G_0}^G V$ tiene la forma

$$x = \sum_{i=1}^n c_i g_i \otimes v_i.$$

Sea $J_0 = \{i \in \{1, \dots, n\} \mid g_i \in G_0\}$ y J_1 su complemento en $\{1, \dots, n\}$. Si $i \in J_1$, entonces podemos escribir $g_i = ag'_i$ para un único $g'_i \in G_0$. Entonces tenemos

$$\begin{aligned} x &= \sum_{i=1}^n c_i g_i \otimes v_i \\ &= \sum_{i \in J_0} c_i g_i \otimes v_i + \sum_{i \in J_1} c_i g_i \otimes v_i \\ &= \sum_{i \in J_0} c_i e \otimes g_i \cdot v_i + \sum_{i \in J_1} c_i a g'_i \otimes v_i \\ (7) \quad &= \sum_{i \in J_0} c_i e \otimes g_i \cdot v_i + \sum_{i \in J_1} c_i a \otimes g'_i \cdot v_i. \end{aligned}$$

Con la descomposición anterior podemos definir las transformaciones lineales

$$\begin{aligned} \Psi: \text{Ind}_{G_0}^G V &\longrightarrow V \oplus aV, \\ \sum_i c_i g_i \otimes v_i &\longmapsto \left(\sum_{i \in J_0} c_i (g_i \cdot v_i), \sum_{i \in J_1} c_i a (g'_i \cdot v_i) \right), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Phi: V \oplus aV &\longrightarrow \text{Ind}_{G_0}^G V, \\ (v, aw) &\longmapsto e \otimes v + a \otimes w. \end{aligned}$$

Gracias a la descomposición 7 vemos que Ψ es la inversa de Φ . Dejamos como ejercicio al entusiasta lector el verificar que estas funciones son compatibles con la acción de (G, ϕ) . \square

Observación 4.6. Notemos que la representación conjugada ρ^* depende en principio del elemento $a \in G \setminus G_0$ que se eligió. Sin embargo, no es difícil comprobar que diferentes elecciones de a producen representaciones isomorfas.

Ahora veremos que los funtores de inducción y restricción son adjuntos. El lector no versado en el lenguaje de categorías puede ignorar la terminología de funtores, adjuntos y naturalidad en esta proposición ya que en el resto del artículo solo utilizamos que existe una biyección.

Proposición 4.7 (Reciprocidad de Frobenius). *Los funtores $\text{Res}_{G_0}^G$ y $\text{Ind}_{G_0}^G$ son adjuntos, es decir, existe una biyección natural*

$$\text{Hom}_{(G, \phi)}(\text{Ind}_{G_0}^G V, W) \longrightarrow \text{Hom}_{G_0}(V, \text{Res}_{G_0}^G W)$$

para cualesquiera representaciones V y W de G_0 y (G, ϕ) , respectivamente.

Demostración: Definamos las funciones

$$\begin{aligned}\Phi: \text{Hom}_{(G, \phi)}(\text{Ind}_{G_0}^G V, W) &\longrightarrow \text{Hom}_{G_0}(V, \text{Res}_{G_0}^G W) \\ f &\longmapsto \Phi(f),\end{aligned}$$

donde $\Phi(f)(v) = f(1 \otimes v)$, y

$$\begin{aligned}\Psi: \text{Hom}_{G_0}(V, \text{Res}_{G_0}^G W) &\longrightarrow \text{Hom}_{(G, \phi)}(\text{Ind}_{G_0}^G V, W), \\ f &\longmapsto \Psi(f),\end{aligned}$$

donde $\Psi(f)(\sum_i c_i g_i \otimes v_i) = \sum_i c_i g_i \cdot f(v_i)$. Es sencillo comprobar que Φ es la inversa de Ψ y que define una transformación natural. \square

5. LEMA DE SCHUR

Las representaciones de grupos magnéticos se pueden descomponer en representaciones más simples (irreducibles), al igual que las representaciones de grupos usuales. La demostración de este hecho es totalmente análoga a la de representaciones de grupos por lo que solo mencionaremos los pasos a seguir.

- Definición de representación irreducible.

Definición 5.1. Una representación V de (G, ϕ) es **irreducible** si sus únicas subrepresentaciones son 0 y V .

- Descomposición de representaciones.

Teorema 5.2 (Maschke). *Sea V una representación de (G, ϕ) y $V_1 \subset V$ una subrepresentación. Entonces existe otra subrepresentación $V_2 \subset V$ tal que $V \cong V_1 \oplus V_2$ como representaciones de (G, ϕ) .*

- Semisimplicidad.

Corolario 5.3. *Toda representación de (G, ϕ) es suma directa de representaciones irreducibles.*

Recordemos el lema de Schur clásico y su demostración pues será de utilidad en los siguientes resultados

Lema 5.4 (Lema de Schur). *Sean V, W dos representaciones irreducibles de G_0 .*

- (1) *Si $T \in \text{Hom}_{G_0}(V, W)$, entonces $T = 0$ ó T es un isomorfismo.*
- (2) *Si $T \in \text{End}_{G_0}(V)$, entonces $T = \lambda \cdot \text{id}_V$ con $\lambda \in \mathbb{C}$. Por lo tanto,*

$$\text{End}_{G_0}(V) \cong \mathbb{C}.$$

Demostración: Sea $T \in \text{Hom}_{G_0}(V, W)$. Entonces $\text{Ker}(T)$ es una subrepresentación de V y $\text{Im}(T)$ es una subrepresentación de W . Como V y W son irreducibles, entonces $\text{Ker}(T) = V$ y $\text{Im}(T) = 0$ ó $\text{Ker}(T) = 0$ y $\text{Im}(T) = W$, es decir, $T = 0$ ó T es un isomorfismo.

Sea $T \in \text{End}_{G_0}(V)$. Puesto que su polinomio característico es un polinomio con coeficientes complejos, obtenemos que T tiene al menos un valor propio $\lambda \in \mathbb{C}$. Notemos que $T - \lambda \cdot \text{id}_V$ es un endomorfismo de V que no puede ser un isomorfismo, por lo tanto $T - \lambda \cdot \text{id}_V = 0$. \square

Notemos que dada una representación irreducible $\rho: G_0 \rightarrow \text{GL}(n)$, la representación conjugada ρ^* puede ser isomorfa a ρ o no. Cuando ρ es isomorfa a ρ^* , el siguiente lema muestra que le podemos asociar un signo lo cual rompe este caso en dos posibilidades. Esto define una partición dentro del conjunto de representaciones irreducibles de G_0 en representaciones de tipo real, complejo y cuaterniónico.

Lema 5.5. *Sea $\rho: G_0 \rightarrow \text{GL}(V)$ una representación irreducible de G_0 , $a \in G \setminus G_0$ y $\rho^*: G_0 \rightarrow \text{GL}(aV)$ su representación conjugada. Entonces ocurre una y solo una de las siguientes dos posibilidades.*

- (1) *Las representaciones ρ y ρ^* no son isomorfas.*
- (2) *Existe un isomorfismo de representaciones $T \in \text{Hom}_{G_0}(\rho^*, \rho)$ tal que*

$$T\bar{T} = \pm\rho(a^2).$$

Demostración: Haremos solo el caso $V = \mathbb{C}^n$. El caso general se deduce de este caso escogiendo una base para V y considerando la definición general de operador conjugado, es decir, la definición 4.3.

Supongamos que existe un isomorfismo $S \in \text{Hom}_{G_0}(\rho^*, \rho)$. Entonces

$$(8) \quad \rho^*(g) = S^{-1}\rho(g)S$$

para todo $g \in G_0$. Usando esta relación y la ecuación 5, obtenemos

$$\begin{aligned} (9) \quad \bar{S}\rho(g) &= \mathbb{K}S\mathbb{K}\rho(a^{-1}aga^{-1}a) \\ &= \mathbb{K}S\rho^*(aga^{-1})\mathbb{K} \\ &= \mathbb{K}\rho(aga^{-1})S\mathbb{K} \\ &= \mathbb{K}\rho(a^{-1}a^2ga^{-2}a)S\mathbb{K} \\ &= \rho^*(a^2ga^{-2})\bar{S}. \end{aligned}$$

Veamos que la composición $S\bar{S}\rho(a^{-2})$ es un isomorfismo de la representación ρ :

$$\begin{aligned} S\bar{S}\rho(a^{-2}) \circ \rho(g) &= S\bar{S}\rho(a^{-2}g) \\ &= S\rho^*(ga^{-2})\bar{S} \\ &= \rho(ga^{-2})S\bar{S} \\ &= \rho(g) \circ \rho(a^{-2})S\bar{S} \\ &= \rho(g) \circ S\rho^*(a^{-2})\bar{S} \\ &= \rho(g) \circ S\bar{S}\rho(a^{-2}), \end{aligned}$$

donde usamos repetidamente las ecuaciones 8 y 9. Por el lema 5.4, existe $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ tal que

$$(10) \quad S\bar{S} = c \cdot \rho(a^2).$$

Mostremos que c es un número real. Se cumple

$$\begin{aligned} \bar{c} \cdot \text{id} &= \mathbb{K}(c \cdot \text{id})\mathbb{K} \\ &= \mathbb{K}S\bar{S}\rho(a^{-2})\mathbb{K} \\ &= \bar{S}S\mathbb{K}\rho(a^{-2})\mathbb{K} \\ &= \bar{S}S\rho^*(a^{-2}) \\ &= \bar{S}\rho(a^{-2})S \\ &= cS^{-1}S \\ &= c \cdot \text{id}, \end{aligned}$$

donde en el penúltimo paso usamos la ecuación 10. Por lo tanto $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Finalmente definimos el morfismo

$$T = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{c}}S, & \text{si } c > 0, \\ \frac{1}{\sqrt{-c}}S, & \text{si } c < 0, \end{cases}$$

de ρ a ρ^* , que satisface la condición deseada. \square

Si T es un isomorfismo como en el segundo caso del lema anterior con $T\bar{T} = \pm\rho(a^2)$, notemos que conjugar la ecuación 6 por la matriz

$$\begin{pmatrix} \text{id} & 0 \\ 0 & T \end{pmatrix}$$

la transforma en

$$(11) \quad \widehat{\rho}(a) = \begin{pmatrix} 0 & \pm T \\ T & 0 \end{pmatrix} \circ \mathbb{K}.$$

donde $\widehat{\rho}$ es la representación resultante de conjugar $\widetilde{\rho}$ por dicha matriz, y el signo de $\pm T$ coincide con el de $\pm \rho(a^2)$.

El siguiente resultado es el lema de Schur en el contexto de grupos magnéticos. Notemos que ahora los endomorfismos de representaciones irreducibles pueden ser más que múltiplos complejos de la identidad.

Lema 5.6 (Lema de Schur). *Sean V, W dos representaciones irreducibles de (G, ϕ) .*

- (1) *Si $T \in \text{Hom}_{(G, \phi)}(V, W)$, entonces T es cero o un isomorfismo.*
- (2) *Si $V = W$ y denotamos $V_0 = \text{Res}_{G_0}^G(V)$, entonces*

$$\text{End}_{(G, \phi)}(V) \cong \begin{cases} \mathbb{R}, & \text{si } V_0 \text{ es irreducible,} \\ \mathbb{C}, & \text{si } V_0 \text{ no es irreducible y } V_0 \not\cong aV_0, \\ \mathbb{H}, & \text{si } V_0 \text{ no es irreducible y } V_0 \cong aV_0. \end{cases}$$

Demostración: El primer inciso se prueba exactamente igual que en el lema 5.4. Supongamos que $\text{Res}_{G_0}^G V$ es irreducible y notemos que

$$\begin{aligned} \text{End}_{(G, \phi)}(V) &= \text{Hom}_{(G, \phi)}(V, V) \\ &\subset \text{Hom}_{G_0}(\text{Res}_{G_0}^G V, \text{Res}_{G_0}^G V) \\ &\cong \mathbb{C}, \end{aligned}$$

donde el último isomorfismo se tiene por el lema 5.4. Es decir, si $T \in \text{End}_{(G, \phi)}(V)$, entonces $T = z \cdot \text{id}$ para cierto $z \in \mathbb{C}$. Cuando consideramos la acción del elemento antilineal a , obtenemos

$$z\rho(a) = T\rho(a) = \rho(a)T = \rho(a) \circ (z \cdot \text{id}) = \bar{z}\rho(a),$$

de donde $z \in \mathbb{R}$ y por lo tanto $\text{End}_{(G, \phi)}(V) \cong \mathbb{R}$.

Ahora supongamos que $\text{Res}_{G_0}^G V$ no es irreducible. Sea U una subrepresentación irreducible de $\text{Res}_{G_0}^G V$. Entonces $U \oplus aU \subset V$ es una representación de (G, ϕ) , y como V es irreducible, tenemos que

$$U \oplus aU = V.$$

Tenemos dos opciones. Si $U \not\cong aU$, podemos calcular el álgebra de endomorfismos usando la reciprocidad de Frobenius y el lema de Schur clásico.

$$\begin{aligned} \text{End}_{(G, \phi)}(V) &= \text{Hom}_{(G, \phi)}(U \oplus aU, U \oplus aU) \\ &\cong \text{Hom}_{G_0}(U, \text{Res}_{G_0}^G(U \oplus aU)) \\ &\cong \text{Hom}_{G_0}(U, U) \times \text{Hom}_{G_0}(U, aU) \\ &\cong \mathbb{C} \times \{0\} \\ &\cong \mathbb{C}. \end{aligned}$$

Por otro lado, si $U \cong aU$, por la proposición 5.5 existe un isomorfismo $T \in \text{Hom}_{G_0}(aU, U)$ tal que $T\bar{T} = \pm\rho(a^2)$. Sin embargo, si $T\bar{T} = \rho(a^2)$, entonces el subespacio vectorial

$$W = \{(u, a^{-1}T(au)) \in V \mid u \in U\}$$

de V sería una subrepresentación propia no trivial, lo que contradice que V sea irreducible. Por lo tanto, se debe tener $T\bar{T} = -\rho(a^2)$. Tras escoger una base de U , cualquier elemento de $\text{End}_{(G,\phi)}(V)$ debe tener la forma

$$A = \begin{pmatrix} x \text{id} & y \text{id} \\ w \text{id} & z \text{id} \end{pmatrix}$$

por el lema de Schur clásico, y debe commutar con la acción de a . Pasando a una representación isomorfa, podemos usar la ecuación 11, de donde

$$\begin{aligned} A\rho(a) &= \begin{pmatrix} x & y \\ w & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -T \\ T & 0 \end{pmatrix} \circ \mathbb{K} = \begin{pmatrix} yT & -xT \\ zT & -wT \end{pmatrix} \circ \mathbb{K}, \\ \rho(a)A &= \begin{pmatrix} 0 & -T \\ T & 0 \end{pmatrix} \circ \mathbb{K} \begin{pmatrix} x & y \\ w & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\bar{w}T & -\bar{z}T \\ \bar{x}T & \bar{y}T \end{pmatrix} \circ \mathbb{K}. \end{aligned}$$

Entonces

$$y = -\bar{w}, \quad x = \bar{z},$$

y por lo tanto

$$\text{End}_{(G,\phi)}(V) = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ -\bar{y} & \bar{x} \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{C} \right\} \cong \mathbb{H}. \quad \square$$

Diremos que una representación V de (G, ϕ) es de tipo real, compleja o cuaterniónica si $\text{End}_{(G,\phi)}(V) \cong \mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$ ó \mathbb{H}^n , respectivamente para algún $n \in \mathbb{N}$.

Corolario 5.7. *Sea V una representación de (G, ϕ) . Entonces V es una representación irreducible de tipo real, complejo o cuaterniónico si y solo si $\text{End}_{(G,\phi)}(V) \cong \mathbb{R}, \mathbb{C}$ ó \mathbb{H} , respectivamente.*

Demostración: El lema de Schur para grupos magnéticos (lema 5.6) nos garantiza la necesidad. Para la suficiencia tomemos una representación V tal que $\text{End}_{(G,\phi)}(V) \cong \mathbb{R}, \mathbb{C}$ ó \mathbb{H} . Por el corolario 5.3, podemos descomponer V como suma de representaciones irreducibles y de nuevo por el lema 5.6, esta suma se divide en representaciones irreducibles de tipo real, complejo o cuaterniónico, es decir,

$$V \cong (\oplus_i A_i^{\oplus \alpha_i}) \oplus (\oplus_j B_j^{\oplus \beta_j}) \oplus (\oplus_k C_k^{\oplus \gamma_k}),$$

con A_i, B_j, C_k representaciones irreducibles no isomorfas de tipo real, complejo o cuaterniónico, respectivamente. Tomando endomorfismos de la descomposición anterior, obtenemos

$$\text{End}_{(G,\phi)}(V) \cong \mathbb{R}^\alpha \times \mathbb{C}^\beta \times \mathbb{H}^\gamma,$$

donde α es la suma de los α_i y similarmente para β y γ . Por lo tanto debe existir un único índice i , j ó k tal que alguna de las multiplicidades α_i , β_j ó γ_k es igual a uno y todas las demás multiplicidades son cero. \square

6. CLASIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES IRREDUCIBLES

Cada uno de los tres diferentes tipos de representaciones irreducibles de G_0 da lugar a una representación irreducible de (G, ϕ) , y viceversa, toda representación irreducible de (G, ϕ) proviene de una representación irreducible de G_0 . La primera demostración de este hecho se debe a Wigner y se puede encontrar en [17].

Diremos que una representación irreducible ρ de G_0 es de tipo compleja si ρ no es isomorfa a ρ^* . Diremos que es de tipo real si existe un isomorfismo $T: \rho^* \rightarrow \rho$ tal que $T\bar{T} = \rho(a^2)$, y de tipo cuaterniónica si existe un isomorfismo $T: \rho^* \rightarrow \rho$ tal que $T\bar{T} = -\rho(a^2)$. Por el lema 5.5, cualquier representación irreducible de G_0 debe cumplir una de estas tres alternativas.

Teorema 6.1 (Clasificación de Wigner). *Sean (G, ϕ) un grupo magnético, $a \in G \setminus G_0$ y $\rho: G_0 \rightarrow \text{GL}(n)$ una representación irreducible. Denotemos por ρ^* a su representación conjugada.*

- Si ρ es de tipo real y

$$T: \rho^* \rightarrow \rho$$

es un isomorfismo de representaciones tal que $T\bar{T} = \rho(a^2)$, entonces produce la representación irreducible

$$(12) \quad g \cdot v = \begin{cases} \rho(g)v, & \text{si } g \in G_0, \\ T \circ \mathbb{K}(v), & \text{si } g = a, \end{cases}$$

de (G, ϕ) sobre \mathbb{C}^n .

- Si ρ es de tipo complejo, entonces $\text{Ind}_{G_0}^G \rho$ es una representación irreducible de (G, ϕ) .
- Si ρ es de tipo cuaterniónico y

$$T: \rho^* \rightarrow \rho$$

es un isomorfismo de representaciones tal que $T\bar{T} = -\rho(a^2)$, entonces $\text{Ind}_{G_0}^G \rho$ es una representación irreducible de (G, ϕ) , que tras el cambio de base por la

matrix $\begin{pmatrix} \text{id} & 0 \\ 0 & T \end{pmatrix}$ tiene la forma

$$G \longrightarrow \mathbf{GL}(2n)$$

$$g \mapsto \begin{cases} \begin{pmatrix} \rho(g) & 0 \\ 0 & \rho(g) \end{pmatrix}, & \text{si } g \in G_0, \\ \begin{pmatrix} 0 & -T \\ T & 0 \end{pmatrix} \circ \mathbb{K}, & \text{si } g = a. \end{cases}$$

Más aún, toda representación irreducible de (G, ϕ) es de una de estas formas.

Demostración: Supongamos que ρ y ρ^* no son isomorfas. Calculemos el álgebra de endomorfismos de la representación $\text{Ind}_{G_0}^G \rho$ usando la reciprocidad de Frobenius. Se tiene

$$\begin{aligned} \text{End}_{(G, \phi)}(\text{Ind}_{G_0}^G \rho) &= \text{Hom}_{(G, \phi)}(\text{Ind}_{G_0}^G \rho, \text{Ind}_{G_0}^G \rho) \\ &\cong \text{Hom}_{G_0}(\rho, \text{Res}_{G_0}^G \text{Ind}_{G_0}^G \rho) \\ &\cong \text{Hom}_{G_0}(\rho, \rho \oplus \rho^*) \\ &\cong \text{Hom}_{G_0}(\rho, \rho) \times \text{Hom}_{G_0}(\rho, \rho^*) \\ &\cong \mathbb{C}, \end{aligned}$$

donde el antepenúltimo isomorfismo se tiene por la proposición 4.5. Por el corolario 5.7, concluimos que $\text{Ind}_{G_0}^G \rho$ es irreducible de tipo complejo.

Si existe un isomorfismo $T: \rho^* \longrightarrow \rho$ tal que $T\bar{T} = \rho(a^2)$, entonces la ecuación 12 define una representación de (G, ϕ) por la observación 4.4. Más aún, en esta ecuación vemos que su restricción a G_0 es ρ , que es irreducible, así que define una representación irreducible de (G, ϕ) . Por el lema 5.6, es de tipo real.

Si existe un isomorfismo $T: \rho^* \longrightarrow \rho$ tal que $T\bar{T} = -\rho(a^2)$, la última parte de la demostración del lema de Schur (lema 5.6), muestra que $\text{End}_{(G, \phi)}(\text{Ind}_{G_0}^G \rho) \cong \mathbb{H}$. Por el corolario 5.7, es una representación irreducible de (G, ϕ) de tipo cuaterniónico. La forma explícita en $g = a$ también se vio en esa demostración, mientras que la forma explícita en G_0 se debe a que

$$\text{Res}_{G_0}^G \text{Ind}_{G_0}^G \rho \cong \rho \oplus \rho^* \cong \rho \oplus \rho,$$

donde el primer isomorfismo se tiene por la Proposición 4.5 y el segundo porque $\rho \cong \rho^*$.

Finalmente, si α es una representación irreducible de (G, ϕ) , entonces la demostración del lema de Schur para grupos magnéticos (lema 5.6) muestra que α se construye a partir de las representaciones irreducibles en $\text{Res}_{G_0}^G \alpha$. \square

El teorema de clasificación de Wigner define un functor

$$\begin{aligned} W_G: \text{Rep}(G_0) &\longrightarrow \mathbf{Rep}(G, \phi), \\ \rho &\longmapsto W_G(\rho), \end{aligned}$$

que manda representaciones irreducibles de G_0 a representaciones irreducibles de (G, ϕ) .

7. EJEMPLOS

En esta sección determinaremos las representaciones irreducibles de los grupos magnéticos $(\mathbb{Z}/2n, \text{mod } 2)$, $(D_n = \mathbb{Z}/n \rtimes \mathbb{Z}/2, \pi_2)$, $(Q_8, Q_8 \xrightarrow{p} Q_8/\langle i \rangle)$.

7.1. $(\mathbb{Z}/2n, \text{mod } 2)$. Notemos que en este caso solo consideramos grupos cíclicos de orden par puesto que los de orden impar solo tienen homomorfismos triviales a $\mathbb{Z}/2$. El grupo magnético $(\mathbb{Z}/2, \text{mod } 2)$ genera la siguiente sucesión exacta corta:

$$0 \longrightarrow G_0 = \mathbb{Z}/n \xrightarrow{\times 2} G = \mathbb{Z}/2n \xrightarrow{\phi = \text{mod } 2} \mathbb{Z}/2 \longrightarrow 0.$$

Elegimos $a = 1 \in \mathbb{Z}/2n$. El grupo $G_0 = \mathbb{Z}/n$ tiene n representaciones irreducibles dadas por

$$\begin{aligned} \chi_l: \mathbb{Z}/n &\longrightarrow \text{GL}(1) \cong \mathbb{C}^\times, \\ 1 &\longmapsto \exp \frac{2\pi il}{n}, \end{aligned}$$

para $l = 0, \dots, n-1$. Usaremos la notación $\exp x$ para e^x porque estaremos manipulando exponentes fraccionarios. Aquí debemos distinguir dos casos:

- Si n es par, aparecen los tres tipos de representaciones. Para ver esto calculemos la representación asociada en los casos $l = 0$, $l = n/2$ y $l \neq 0, n/2$.

Cuando $l = 0$, la representación conjugada está dada por

$$\chi_0^*(g) = \bar{\chi}_0(g) = 1 = \chi_0(g),$$

así que χ_0^* es isomorfa a χ_0 con isomorfismo $T = 1$. Más aún, $T\bar{T} = \chi_0(a^2)$, por lo que χ_0 es de tipo real y genera la representación irreducible

$$\begin{aligned} W_{\mathbb{Z}/2n}(\chi_0): (\mathbb{Z}/2n, \text{mod } 2) &\longrightarrow \mathbf{GL}(\mathbb{C}), \\ l &\longmapsto \mathbb{K}^l. \end{aligned}$$

de $(\mathbb{Z}/2n, \text{mod } 2)$.

Si $l = n/2$, calculemos la representación conjugada

$$\chi_{n/2}^*(g) = \overline{\left(\exp \frac{2\pi in/2}{n} \right)^g} = (-1)^g = \chi_{n/2}(g).$$

Por lo tanto $\chi_{n/2}^*$ y $\chi_{n/2}$ son isomorfas con isomorfismo $T = \text{id}$. Además se tiene que

$$T\bar{T} = -\chi_{n/2}(a^2),$$

por lo que $\chi_{n/2}$ es de tipo cuaterniónico. Entonces $\chi_{n/2}$ genera la representación irreducible de $(\mathbb{Z}/2n, \text{mod } 2)$ dada por

$$\begin{aligned} W_{\mathbb{Z}/2n}(\chi_{n/2}): (\mathbb{Z}/2n, \text{mod } 2) &\longrightarrow \mathbf{GL}(\mathbb{C}^2), \\ 1 &\longmapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \circ \mathbb{K}. \end{aligned}$$

Finalmente, si $l \neq 0, n/2$, calculemos la representación conjugada

$$\chi_l^*(g) = \overline{\left(\exp \frac{2\pi i l}{n} \right)^g} = \left(\exp \frac{2\pi i(n-l)}{n} \right)^g = \chi_{n-l}(g).$$

Como χ_l y χ_{n-l} no son isomorfas, entonces χ_l genera la siguiente representación irreducible

$$\begin{aligned} W_{\mathbb{Z}/2n}(\chi_l): (\mathbb{Z}/2n \text{ mod } 2), &\longrightarrow \mathbf{GL}(\mathbb{C}^2), \\ 1 &\longmapsto \begin{pmatrix} 0 & \exp \frac{2\pi i}{n} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \circ \mathbb{K}. \end{aligned}$$

de $(\mathbb{Z}/2n, \text{mod } 2)$.

- Si n es impar, tenemos solo el primer y tercer tipo de representaciones que aparecen en el caso anterior.

7.2. ($D_n = \mathbb{Z}/n \rtimes \mathbb{Z}/2, \pi_2$). En la descripción de D_n como producto semidirecto, el subgrupo \mathbb{Z}/n es el generado por las rotaciones y $\mathbb{Z}/2$ el generado por una reflexión fija. La acción del elemento no trivial $1 \in \mathbb{Z}/2$ en \mathbb{Z}/n está dada por

$$1 \cdot l = -l = n - l.$$

Este grupo magnético produce la sucesión exacta corta

$$1 \longrightarrow G_0 = \mathbb{Z}/n \longrightarrow G = \mathbb{Z}/n \rtimes \mathbb{Z}/2 \xrightarrow{\pi_2} \mathbb{Z}/2 \longrightarrow 1$$

Tomemos $a = (0, 1)$. En este caso, $G_0 = \mathbb{Z}/n$ es el mismo grupo que en el ejemplo anterior. Calculemos las representaciones asociadas.

$$\begin{aligned} \chi_l^*(g) &= \overline{\chi_l(a^{-1}ga)} \\ &= \overline{\left(\exp \frac{2\pi i l}{n} \right)^{n-g}} \\ &= \exp \frac{2\pi i l(g-n)}{n} \\ &= \left(\exp \frac{2\pi i l}{n} \right)^g \\ &= \chi_l(g). \end{aligned}$$

Puesto que $\chi_l \cong \chi_l^*$ y el isomorfismo es $T = \text{id}$, tenemos

$$T\bar{T} = 1 = \chi_l(0) = \chi_l(a^2).$$

Por lo tanto todas las representaciones χ_l son de tipo real y generan las n representaciones irreducibles de (D_n, π_2) dadas por

$$\begin{aligned} W_{D_n}(\chi_l): (D_n, \pi_2) &\longrightarrow \mathbf{GL}(\mathbb{C}), \\ (n, \varepsilon) &\longmapsto \chi_l(n) \circ \mathbb{K}^\varepsilon, \end{aligned}$$

para $0 \leq l \leq n - 1$.

7.3. ($Q_8, Q_8 \xrightarrow{q} Q_8/\langle i \rangle$). El grupo de los cuaterniones $Q_8 = \{1, -1, i, -i, j, -j, k, -k\}$ contiene al subgrupo normal $G_0 = \langle i \rangle \cong \mathbb{Z}/4$. El cociente de Q_8 por G_0 tiene orden dos, por lo cual podemos considerar al grupo magnético (Q_8, q) , donde q es la composición del cociente $Q_8 \rightarrow Q_8/\langle i \rangle$ con el isomorfismo $Q_8/\langle i \rangle \rightarrow \mathbb{Z}/2$. Esto determina la sucesión exacta

$$1 \longrightarrow G_0 = \langle i \rangle \longrightarrow G = Q_8 \xrightarrow{q} \mathbb{Z}/2 \longrightarrow 1.$$

Tomemos $a = j$ y calculemos las representaciones conjugadas.

$$\begin{aligned} \chi_l^*(g) &= \overline{\left(\exp \frac{2\pi il}{4} \right)^{-jgj}} \\ &= \overline{(il)^{-jgj}} \\ &= \begin{cases} 1 & \text{si } l = 0 \\ i^{g^{-1}} & \text{si } l = 1 \\ (-1)^{g^{-1}} & \text{si } l = 2 \\ \overline{(-i)^{g^{-1}}} & \text{si } l = 3 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1 & \text{si } l = 0 \\ i^g & \text{si } l = 1 \\ (-1)^g & \text{si } l = 2 \\ (-i)^g & \text{si } l = 3 \end{cases} \\ &= \chi_l(g). \end{aligned}$$

Por lo tanto la representación χ_l^* es isomorfa a χ_l con isomorfismo $T = \text{id}$. Tenemos que

$$T\bar{T} = (-1)^l \chi_l(a^2),$$

por lo que χ_0 y χ_2 son reales, mientras que χ_1 y χ_3 son cuaterniónicas. Las dos primeras representaciones generan las representaciones irreducibles

$$\begin{aligned} W_{Q_8}(\chi_0): (Q_8, q) &\longrightarrow \mathbf{GL}(\mathbb{C}), \\ i &\longmapsto 1, \\ j &\longmapsto \mathbb{K}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W_{Q_8}(\chi_2): (Q_8, q) &\longrightarrow \mathbf{GL}(\mathbb{C}), \\ i &\longmapsto -1, \\ j &\longmapsto \mathbb{K}. \end{aligned}$$

Las otras dos representaciones generan las siguientes representaciones irreducibles:

$$\begin{aligned} W_{Q_8}(\chi_1): (Q_8, q) &\longrightarrow \mathbf{GL}(\mathbb{C}^2), \\ i &\longmapsto \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}, \\ j &\longmapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \mathbb{K}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W_{Q_8}(\chi_3): (Q_8, q) &\longrightarrow \mathbf{GL}(\mathbb{C}^2), \\ i &\longmapsto \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \\ j &\longmapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \mathbb{K}. \end{aligned}$$

8. COMENTARIOS FINALES

La teoría de representaciones de grupos magnéticos que presentamos aquí tiene múltiples expansiones y generalizaciones. Por ejemplo, ¿por qué fijarnos solamente en el grupo de Galois de la extensión \mathbb{C}/\mathbb{R} ? Si nos olvidamos de la aplicación a la física, entonces podemos considerar extensiones de Galois generales F/k y trabajar con la teoría de representaciones de grupos $(G, \phi: G \rightarrow \text{Aut}_k(F))$ donde G es un grupo y ϕ es un homomorfismo al grupo de automorfismos de la extensión de campos. En esta dirección se puede consultar [6].

Otra expansión de la teoría de representaciones magnéticas y que ha estado activa en los últimos años es la teoría K equivariante. Hasta ahora solo hemos considerado espacios vectoriales aislados con acciones de un grupo magnético, pero ¿qué pasa si tenemos una familia de estos espacios parametrizada por un espacio topológico compacto Hausdorff con una acción del grupo? En este contexto, los objetos con los que se trabajan son los haces vectoriales equivariantes. Dichos objetos también son

usados en materia condensada para modelar fases topológicas de la materia, el lector interesado puede consultar [3], [7] y [12].

Para quienes deseen ver estas ideas en acción, en su entorno natural, la física de la materia condensada, pueden consultar los artículos [9], [10], [15] y las referencias ahí contenidas. Cabe señalar que en dichos trabajos, los grupos magnéticos y sus representaciones constituyen una herramienta subyacente. Aunque no siempre aparezcan de manera explícita, muchas de las construcciones teóricas dependen crucialmente de que los materiales considerados exhiban estas simetrías.

Para finalizar y como nota histórica, en los primeros años de la mecánica cuántica, la teoría de grupos y sus representaciones fue recibida con escepticismo en este campo. Algunos físicos, como Erwin Schrödinger, llegaron a llamarla despectivamente “Gruppenpest” (la “peste” de la teoría de grupos), al considerarla demasiado formal y alejada de los problemas prácticos de la física. Con el tiempo, sin embargo, quedó claro que este lenguaje matemático es esencial para entender las simetrías de los sistemas y la estructura de las partículas elementales.

REFERENCIAS

1. C. Bradley and A. Cracknell, *The mathematical theory of symmetry in solids: Representation theory for point groups and space groups*, EBSCO ebook academic collection, OUP Oxford, 2010.
2. E. S. Fedorov, *Symmetry of crystals*, American Crystallographic Association Monograph, no. 7, American Crystallographic Association, Buffalo, N.Y., 1971, English translation of the original 1891 Russian work.
3. Daniel S. Freed and Gregory W. Moore, *Twisted equivariant matter*, Annales Henri Poincaré **14** (2013), no. 8, 1927–2023.
4. William Fulton and Joe Harris, *Representation theory: A first course*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 129, Springer-Verlag, New York, NY, 1991.
5. Samuel V. Gallego, J. Manuel Pérez-Mato, Luis Elcoro, Emre S. Tasci, Robert M. Hanson, Koichi Momma, Mois I. Aroyo, and Gotzon Madariaga, *MAGNDATA: towards a database of magnetic structures. I. The commensurate case*, Journal of Applied Crystallography **49** (2016), no. 5, 1750–1776.
6. Philippe Gille and Tamás Szamuely, *Central simple algebras and Galois cohomology*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, Cambridge University Press, 2006.
7. Kiyonori Gomi, *Freed–Moore K-theory*, Communications in Analysis and Geometry **31** (2023), no. 4, 883–937.
8. Rafael González-Hernández, Higinio Serrano, and Bernardo Uribe, *Spin Chern number in altermagnets*, Phys. Rev. B **111** (2025), 085127.
9. Rafael González-Hernández and Bernardo Uribe, *Average spin Chern number*, Phys. Rev. B **110** (2024), 125129.
10. ———, *Model Hamiltonian for altermagnetic topological insulators*, Phys. Rev. B **112** (2025), 184101.
11. M. Z. Hasan and C. L. Kane, *Colloquium: Topological insulators*, Rev. Mod. Phys. **82** (2010), 3045–3067.

12. Bernardo Uribe Jongbloed, Higinio Serrano Garcia, and Miguel Alejandro Xicoténcatl Merino, *Magnetic equivariant K-theory: Topological invariants of magnetic symmetries*, 1 ed., Springer-Briefs in Mathematics, Springer Cham, 2025.
13. Panagiotis Kotetes, *Chern insulators—fundamentals*, Topological Insulators, 2053-2571, Morgan & Claypool Publishers, 2019, pp. 5–1 to 5–22.
14. Daniel B. Litvin, *Magnetic group tables: 1-, 2- and 3-dimensional magnetic subperiodic groups and magnetic space groups*, International Union of Crystallography, 2013.
15. Victor Mendoza-Estrada, Rafael González-Hernández, Bernardo Uribe, and Libor Šmejkal, *Eightfold degenerate Dirac nodal line in the collinear antiferromagnet Mn₅Si₃*, Phys. Rev. B **111** (2025), 085147.
16. A. V. Shubnikov and N. V. Belov, *Colored symmetry*, Pergamon Press, Oxford; New York, 1964, Translation of works originally published in Russian between 1951 and 1958.
17. Eugene P. Wigner, *Group theory and its application to the quantum mechanics of atomic spectra*, Pure and Applied Physics, Vol. 5, Academic Press, New York-London, 1959, Expanded and improved ed. Translated from the German by J. J. Griffin.
18. Jian Yang, Zheng-Xin Liu, and Chen Fang, *Symmetry invariants and classes of quasiparticles in magnetically ordered systems having weak spin-orbit coupling*, Nature Commun. **15** (2024), no. 1, 10203.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS, A.C. UNIDAD MÉRIDA,
 PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE YUCATÁN,
 CARRETERA SIERRA PAPACAL–CHUBURNÁ PUERTO KM 5.5,
 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA, YUC 97302,
 MEXICO.

Email address: cantarero@cimat.mx

INSTITUTE OF MATHEMATICS AND INFORMATICS,
 BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES,
 ACAD. GEORGI BONCHEV STR., BLOCK 8,
 1113 SOFIA,
 BULGARIA.

Email address: hserrano@math.cinvestav.mx